

Становище на Експертния съвет по медицинската специалност „Клинична хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

Пациентите с хематологични заболявания (малигнени и бенигнени) са често с компрометиран имунитет, свързан както с основното заболяване, така и с провежданата терапия. Посоченото е предпоставка за повишена честота и риск от възможни сериозни инфекциозни усложнения. Онкохематологичните заболявания са около 10% от всички злокачествени заболявания. Наред с малигнената патология в клиничната хематология има богат спектър бенигнени заболявания, характерни със своята специфика по отношение на хемостазата.

Решението дали имунокомпрометиран пациент трябва да се ваксинира не трябва да се влияе от обстоятелството дали е бил инфектиран с COVID-19 или не.

Членовете на ЕС се запознаха подробно с актуализираните препоръки на:

1. Recommendations for COVID-19 vaccination in patients with hematologic cancer: European Hematology Association; 2021 Available from: <https://ehaweb.org/covid19/eha-statement-on-covid-19-vaccines/recommendations-for-covid-19-vaccination-inpatients-with-hematologic-cancer/>
2. COVID-19 Vaccine in patients with haematological disorders British Society for Hematology [updated 15-th December 2021. Available from: <https://b-s-h.org.uldaboutus/news/covid-19-updates/>
3. National Comprehensive Cancer Network@ (NCCN@) COVID-19 Vaccination Advisory Committee* 2021 (https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-19_vaccination_guidance_v4-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_70)

Предвид гореизложеното ЕС по клинична хематология приема позицията, че ползата от ваксинацията срещу COVID-19 на пациентите с хематологични заболявания, особено за хората над 65г. (поради честото съчетание със сателитна морбидност) превишава потенциалния риск, свързан със самата ваксинация. Задължително е спазване на принципа за „споделено вземане на решение“ от страна на лекуващия / проследяващия екип за всеки конкретен пациент.

На този етап ЕС по клинична хематология приема, че липсват абсолютни противопоказания за ваксинация при нозологичните единици в клиничната

хематология. Необходимо е да се спазват общите противопоказания, специални предупреждения и предпазни мерки при употреба на съответната ваксина.

Всяко решение за ваксинация пациентът с хематологично заболяване (малигнено или бенигнено) трябва да обсъди с лекуващия / проследяващ хематологичен екип или хематолог от доболнична помощ за подходящия период на ваксинация в зависимост от вида на провежданата терапия, фазата на терапевтичния цикъл, статуса на заболяването, конкретните стойности на хематологичните и коагулационни показатели, вида на ваксината и др.

Становището е подкрепено с мнозинство от членовете на ЕС.